

## لائحة الأدوية الخطيرة La liste des médicaments dangereux

**Attention:** Il ne faut en aucun cas arrêter le traitement de l'un de ces médicaments sans avoir préalablement pris conseil auprès de votre pharmacien et/ou consulté votre médecin.

Cette liste est limitée aux médicaments pour traiter les troubles psychiatriques et psychologiques

| Le nom international du médicament                            | Indications - utilisation  | Effets secondaires possibles  |
|---|--|---|
| ACCOLATE (zafirlukast)  | l'asthme   | l'asthme, lésion hépatique, neuropathie, des problèmes cardiaques, pulmonaires aggravation de l'état  |
| Adartrel, Requip (ropinirole)                                 | Troubles du sommeil à haute dose, maladie de Parkinson.  | nausées, comportements impulsifs, libido exacerbée, hallucinations, paranoïa, syncopes.. alors qu'il s'agit au départ de résoudre un problème relativement bénin. Risque de voir augmenter les symptômes après une première phase d'amélioration. |
| ATIVAN (lorazépam)  | la panique et l'anxiété  | la toxicomanie, dépression, vertiges, troubles du sommeil, de la peau et les problèmes d'estomac  |
| CHAMPIX® (varénicline)  | Sevrage tabagique  | signal de troubles psychiatriques et conduites suicidaires.   |
| CELANCE® (pergolide)  | Traitement de la maladie de parkinson  | risque de valvulopathies  |
| CYMBALTA® (duloxétine) troubles hépatiques, risque suicidaire | Episodes dépressifs majeurs douleurs neuropathiques diabétiques périphériques troubles d'anxiété généralisée, troubles hépatiques, risque suicidaire | Troubles hépatiques, risque suicidaire  |
| DI-ANTALVIC   | anti-douleur comprenant du dextropropoxyphène associé à du paracétamol.  | Trouble psychiatrique et cardiovasculaire, arrêt cardiaque. Plusieurs centaines d'overdoses mortelles.  |
| ÉPHEDRA (ma-guang)  | gestion du poids   | crise cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, de crises d'épilepsie, la dépression, la mort RAPPELER: Déc-03  |
| EQUANIL®, méprobamate RICHARD                                 | Aide au sevrage chez le sujet alcool-dépendant lorsque le rapport bénéfice/risque des benzodiazépines ne paraît pas favorable.                       | en surdosages volontaires conduit au décès  |
| INTRINSA® (testostérone)                                      | Traitement de la baisse du désir sexuel chez les femmes ayant subi une ablation des ovaires et de l'utérus   | Étude d'utilisation afin de déterminer les caractéristiques des patients et d'évaluer le risque de mésusage.  |
| ISOTREINOÏNE et génériques                                    | Acné sévère  | Enquête en raison du risque tératogène, des problèmes psychiatriques Risque de troubles dépressifs avant et pendant traitement en cours   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| LAMICTAL<br>(lamotrigine)                                     | Complément de l'épilepsie, la<br>dépression bipolaire  | (lamotrigine) adjoint pour l'épilepsie, la<br>dépression bipolaire Steven Johnson,<br>syndrome, des dizaines, plus ..  |
| LYRICA®<br>(prégabaline)                                      | Traitement des crises épileptiques<br>partielles avec ou sans généralisation<br>secondaire, des<br>douleurs neuropathiques et du<br>trouble anxieux généralisé | surveillance de certains risques<br>en particulier cutanés<br>(toxidermies graves), oculaires,<br>hématologiques   |
| Mellaril (thioridazine)                                       | la schizophrénie   | (thioridazine) schizophrénie vie en danger<br>rythme cardiaque irrégulier  |
| MEPRONIZINE®<br>(méprobamateacépro<br>métazine)               | Insomnie occasionnelle   | Risque de surdosage volontaire   |
| METHADONE AP-HP<br>sirop et gélules                           | Traitement substitutif des<br>pharmacodépendances majeures<br>aux opiacés  | surveillance du profil de tolérance - abus,<br>mésusage, surdosage accidentel<br>notamment chez l'enfant   |
| Méthylphénidate<br>(RITALINE®,<br>CONCERTA®,<br>QUASYM®)      | Trouble de l'attention avec<br>hyperactivité chez l'enfant de + de 6<br>ans, sans limite d'âge   | Suivi d'addictovigilance depuis février 2006<br>en raison des cas d'abus et d'usage détourné   |
| NOCTRAN®<br>(acépromazine,<br>acéprométazine,<br>clorazépate) | Troubles sévères du sommeil  | actifs sans intérêt - Importante utilisation<br>chronique - essentiellement chez<br>sujets > 60 ans  |
| <u>Paxil (paroxétine)</u>                                     | la dépression, l'anxiété, d'autres<br>conditions mentales  | (paroxétine) la dépression, l'anxiété, d'autres<br>troubles mentaux, idées et tentatives de<br>suicide, etc.   |
| <u>Prozac (fluoxétine)</u>                                    | dépression, TOC, TDP   | (fluoxétine) la dépression, TOC, PMDD<br>problèmes cardiaques, pertes de mémoire,<br>problèmes sexuels   |
| RIVOTRIL®<br>(clonazépam)                                     | Traitement de l'épilepsie<br>chez l'adulte et chez<br>l'enfant   | Suivi renforcé d'addictovigilance (cas d'abus,<br>de dépendance et d'usage<br>détourné)  |
| <u>Risperdal (risperdone)</u>                                 | la schizophrénie   | (risperdone) schizophrénie accident<br>vasculaire cérébral, de caillots de sang, de<br>mort  |
| <u>Ritalin<br/>(méthylphénidate)</u>                          | TDAH (hyperactivité)   | (méthylphénidate) TDAH interactions<br>médicamenteuses, de la toxicomanie, les<br>saisies, etc.  |
| ROHYPNOL®<br>(flunitrazépam)                                  | Troubles sévères du sommeil  | Enquête d'addictovigilance des cas d'abus,<br>de dépendance et d'usage détourné depuis<br>2000 Modification des conditions de<br>prescription et de délivrance en octobre 2000 |
| SERENTIL<br>(mesoridazine)                                    | la schizophrénie et autres troubles<br>psychiatriques  | problèmes cardiaques, des convulsions, des<br>éruptions cutanées, l'interaction avec des<br>antiacides, plus   |
| <u>Seroquel (quetiapine)</u>                                  | la schizophrénie   | (quetiapine) aggravation des symptômes<br>schizophréniques, le diabète, l'hypotension  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Serzone (néfazodone)                   | la dépression   | (néfazodone) dépression insuffisance hépatique et la mort  |
| STABLON® (tianeptine)                  | Épisodes dépressifs majeurs   | Rares : (Gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences. . Insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie. Tachycardie, extrasystoles, précordialgies. Vertiges, céphalées, lipothymie, tremblements, bouffées de chaleur. Gêne respiratoire, boule dans la gorge. Myalgies, lombalgies. Etc, ) |
| STILNOX® et génériques (zolpidem)      | Troubles sévères du sommeil   | Enquête d'addictovigilance : mésusage, abus  |
| SUBUTEX® et génériques (buprenorphine) | Traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés   | Suivi renforcé de PV et d'addictovigilance depuis la mise sur le marché des génériques, Études d'utilisation en cours  |
| TRIVASTAL® (piribédil)                 | Déficit pathologique cognitif et neurosensoriel chronique du sujet âgé (à l'exclusion d'Alzheimer et autres démences), claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs, maladie de Parkinson | Enquête de PV suite à des cas de somnolence et d'attaques de sommeil en cours  |
| VALDOXAN® (agomélatine)                | Épisodes dépressifs majeurs caractérisés  | Suivi renforcé de PV mis en place lors de la commercialisation (en particulier suivi des atteintes hépatiques)   |
| ZYBAN® (chlorhydrate de bupropion)     | Sevrage tabagique   | risque de troubles psychiatriques  |
| ZYPADHERA® (olanzapine)                | Schizophrénie épisodes maniaques récidives de trouble bipolaire   | Suivi renforcé de PV mis en place lors de la commercialisation (en particulier suivi du risque de syndrome post injection)   |
| Zyprexa (olanzapine)                   | schizophrénie et troubles bipolaires.   | pouvait provoquer une obésité sévère. la survenue d'une hyperglycémie (un des symptômes du diabète) était plus fréquente qu'avec d'autres que médicaments.   |

Sources: **L'Agence** française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), dossiers de presse de l' « expresse » - site « santé canada », PV: PharmacoVigilance

### La liste non exhaustive des médicaments dangereux ou à risque:

Actos (diabète) , Alli, Arcoxia, Arixtra, Bleu patente V, Byetta (diabète), Celance, Cervarix, Champix (sevrage tabac), Cimzia, Colokite, Cymbalta (dépression), Diantalvic, Efient, Elaone, Equanil (sevrage alcool), Exjade, Ferrisat, Fonzylane, Galvus, Eucreas, Gardasil, Gliven, Hexaquine, Intrensa, Isentress, Ianumet, Ianuvia, Ketum, Levothyrox, Lipiocis, Lyrica, Mepronizine (insomnie), Methadone, Ritaline, Mynocine, Multaq, Nexen, Noctran (sommeil), Ongliza, Orienca, Parlodel, Pedeia, Pholcodine (toux), pradaxa, praxinor (hypotension), prevenar, primalan, procoralan, protelos, protopic, revlimid, Rivotril, Roacterma, Rohypnol (sommeil), Soriatane, Stablon (dépression), Stelara, stilnox, Subutex, Thalidomide Celgene, Toctino, Tramadol, Trivastal, Tysabri (sclérose), Valdoxan, Vastarel, Vfend, Victoza, Xarelto, Xyrem, Zypadhera, Zyban (sevrage tabac), Zyvoxid.